

りんくう総合医療センター 外来化学療法レジメン

【消化器外科】(大腸)

《術後補助化学療法》

① CAPOX 療法

1 コース: 21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上～1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上～1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

② Capecitabine 療法(B 法)

1 コース: 21 日間

カペシタビン(内服) 1200mg/m²/回 1 日 2 回 1~14 日目

体表面積	1 回用量
1. 33m ² 未満	1500mg/回
1. 33m ² 以上～1. 57m ² 未満	1800mg/回
1. 57m ² 以上～1. 81m ² 未満	2100mg/回
1. 81m ² 以上	2400mg/回

③ UFT+LV 療法

1 コース: 35 日間

テガフルル/ウラシル配合剤(内服) 100mg/m²/回 1 日 3 回 1~28 日目

体表面積	1 日用量
<1. 17 m ²	300mg/日(午前:100mg/午後:100mg/夜間:100mg)
1. 17m ² ～1. 49m ²	400mg/日(午前:200mg/午後:100mg/夜間:100mg)
1. 50m ² ～1. 83m ²	500mg/日(午前:200mg/午後:200mg/夜間:100mg)
>1. 83m ²	600mg/日(午前:200mg/午後:200mg/夜間:200mg)

ホリナート(内服) 25mg/回 1 日 3 回 1~28 日目

④ S-1 療法

1 コース：42 日間

テガフルル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回

1 日 2 回 1～28 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

《薬物療法》

① CAPOX+BEV 療法

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上～1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上～1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリ プラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

ベバシズマブ(点滴) 7. 5mg/kg 1 日目

② SOX+BEV 療法

1 コース:21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

オキサリ プラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

ベバシズマブ(点滴) 7. 5mg/kg 1 日目

③ IRIS+BEV 療法 (S-1+IRI+BEV)

1 コース:21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

イリノテカン(点滴) 150mg/m² 1 日目

ベバシズマブ(点滴) 7. 5mg/kg 1 日目

④ Cape+BEV 療法

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上～1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上～1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

ベバシズマブ(点滴) 7. 5mg/kg 1 日目

⑤ S-1+BEV 療法

1 コース:21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

ベバシズマブ(点滴) 7. 5mg/kg 1 日目

⑥ CAPIRI+BEV 療法

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 800mg/m² 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 31m ² 未満	900mg/回
1. 31m ² 以上～1. 69m ² 未満	1200mg/回
1. 69m ² 以上～2. 07m ² 未満	1500mg/回
2. 07m ² 以上	1800mg/回

イリノテカン(点滴) 200mg/m² 1 日目

⑦ IRIS+PANI 療法(S-1+IRI+PANI) [RAS (KRAS/NRAS) /BRAF 遺伝子 野生型]

1 コース:28 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40~60mg/回

1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上~1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

イリノテカン(点滴) 100mg/m² 1, 15 日目

パニツムマブ(点滴) 6mg/kg 1, 15 日目

⑧ CAPOX+CET 療法 [RAS (KRAS/NRAS) /BRAF 遺伝子 野生型]

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上~1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上~1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

セツキシマブ(点滴) 1 コース目

400mg/m² 1 日目

250mg/m² 8, 15 日目

2 コース目以降

250mg/m² 1, 8, 15 日目

⑨ CAPOX+PANI 療法

〔RAS (KRAS/NRAS) /BRAF 遺伝子 野生型〕

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上～1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上～1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

パニツムマブ(点滴) 6mg/kg 1 日目

⑩ SOX+CET 療法

〔RAS (KRAS/NRAS) /BRAF 遺伝子 野生型〕

1 コース:21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回

1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

セツキシマブ(点滴) 1 コース目

400mg/m² 1 日目250mg/m² 8, 15 日目

2 コース目以降

250mg/m² 1, 8, 15 日目

⑪ S-1+PANI 療法

[RAS (KRAS/NRAS) /BRAF 遺伝子 野生型]

1 コース:14 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40~60mg/回

1 日 2 回 2~8 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上~1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

パニツムマブ(点滴)

6mg/kg

1 日目

⑫ FTD/TPI 療法

1 コース:28 日間

トリフルリジン/チピラシル配合剤 35mg/m²/回

1 日 2 回 1~5 日目 8~12 日目

体表面積	1 回用量
1. 07m ² 未満	35mg/回
1. 07m ² 以上~1. 23m ² 未満	40mg/回
1. 23m ² 以上~1. 38m ² 未満	45mg/回
1. 38m ² 以上~1. 53m ² 未満	50mg/回
1. 53m ² 以上~1. 69m ² 未満	55mg/回
1. 69m ² 以上~1. 84m ² 未満	60mg/回
1. 84m ² 以上~1. 99m ² 未満	65mg/回
1. 99m ² 以上~2. 15m ² 未満	70mg/回
2. 15m ² 以上	75mg/回

⑬ FTD/TPI+BEV 療法

1 コース:28 日間

トリフルリジン/チピラシル配合剤 35mg/m²/回

1 日 2 回 1~5 日目 8~12 日目

体表面積	1 回用量
1. 07m ² 未満	35mg/回
1. 07m ² 以上~1. 23m ² 未満	40mg/回
1. 23m ² 以上~1. 38m ² 未満	45mg/回
1. 38m ² 以上~1. 53m ² 未満	50mg/回
1. 53m ² 以上~1. 69m ² 未満	55mg/回
1. 69m ² 以上~1. 84m ² 未満	60mg/回
1. 84m ² 以上~1. 99m ² 未満	65mg/回
1. 99m ² 以上~2. 15m ² 未満	70mg/回
2. 15m ² 以上	75mg/回

ベバシズマブ(点滴)

5mg/kg

1, 15 日目

⑯ REG 療法

1 サイクル : 28 日間

レゴラフェニブ(内服) 160mg/回 1 日 1 回 1~21 日目

【消化器外科】(胃)

《術後補助化学療法》

① S-1 療法

1 クール:42 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40~60mg/回 1 日 2 回 1~28 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上~1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

《薬物療法》

① S-1+CDDP 療法 [HER2 遺伝子 陰性]

1 コース:35 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40~60mg/回 1 日 2 回 1~21 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上~1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

シスプラチニン(点滴) 60mg/m² 8 日目

② Cape+CDDP 療法 [HER2 遺伝子 陰性]

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上~1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上~1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

シスプラチニン(点滴) 80mg/m² 1 日目

③ S-1+OHP 療法(SOX) [HER2 遺伝子 陰性]

1 コース:21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40~60mg/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上~1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

オキサリプラチン(点滴) 100mg/m² 1 日目

④ Cape+OHP 療法(CapeOX) [HER2 遺伝子 陰性]

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上~1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上~1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

⑤ Cape+CDDP+T-mab 療法 [HER2 遺伝子 陽性]

1 コース:21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上~1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上~1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

シスプラチン(点滴) 80mg/m² 1 日目

トラスツズマブ(点滴)	初回	8mg/kg	1 日目
	2 回目以降	6mg/kg	1 日目

⑥ Cape+OHP+T-mab 療法 (CapeOX+T-mab) [HER2 遺伝子 陽性]

1 コース: 21 日間

カペシタビン(内服) 1000mg/m²/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 36m ² 未満	1200mg/回
1. 36m ² 以上～1. 66m ² 未満	1500mg/回
1. 66m ² 以上～1. 96m ² 未満	1800mg/回
1. 96m ² 以上	2100mg/回

オキサリプラチン(点滴) 130mg/m² 1 日目

トラスツズマブ(点滴)	初回	8mg/kg	1 日目
	2 回目以降	6mg/kg	1 日目

⑦ S-1+DTX 療法

1 クール: 21 日間

テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム配合剤(内服) 40～60mg/回 1 日 2 回 2~15 日目

体表面積	1 回用量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上～1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

ドセタキセル(点滴) 40mg/m² 1 日目

⑧ FTD/TPI 療法

1 コース: 28 日間

トリフルリジン/チピラシル配合剤 35mg/m²/回 1 日 2 回 1~5 日目 8~12 日目

体表面積	1 回用量
1. 07m ² 未満	35mg/回
1. 07m ² 以上～1. 23m ² 未満	40mg/回
1. 23m ² 以上～1. 38m ² 未満	45mg/回
1. 38m ² 以上～1. 53m ² 未満	50mg/回
1. 53m ² 以上～1. 69m ² 未満	55mg/回
1. 69m ² 以上～1. 84m ² 未満	60mg/回
1. 84m ² 以上～1. 99m ² 未満	65mg/回
1. 99m ² 以上～2. 15m ² 未満	70mg/回
2. 15m ² 以上	75mg/回